

Aves de Isla Palma

ARCELIO U. BLANCO NUÑEZ



En este mi segundo viaje a isla Palma, me he hecho el propósito de recolectar la fauna aviar de la Isla y disfrutar de la belleza que este islote ofrece a los visitantes. Es una de las 10 Islas del Archipiélago de San Bernardo, ubicada en el Golfo de Morrosquillo en la Costa Caribe Colombiano.


Archipiélago de San Bernardo. Isla Palma.

El archipiélago de San Bernardo, es un conjunto de 10 islas coralinas pertenecientes a Colombia, ubicadas en el Golfo de Morrosquillo, en el Mar Caribe, con una extensión de 213.3 Kms cuadrados. Forman parte del parque nacional natural de Los Corales del Rosario y San Bernardo. Administrativamente el archipiélago pertenece a Cartagena, a excepción de la Isla Boquerón que pertenece al municipio de San Onofre.

El archipiélago está conformado por las siguientes islas: Isla *Boquerón, Isla Palma, Panda, Mangle, Ceycén, Cabruna,Tintipan, Maravilla, Múcura y Santa Cruz del Islote*.

Isla Palma situada a 9°44´24" N, 75°44´49" W (Google Earth) aparece en el mapa como Isla Salamanquilla, forma parte del Parque natural Isla Palma, está dotada de un hotel con comodidades de alojamiento, comidas y comunicaciones. Tiene una fauna nativa y migratoria; y algunos especímenes introducidos al parque natural como parte de un pequeño Zoológico. Hay un ambiente marino de playa, un ambiente cenagoso y de Bosque tropical, que le permite tener una fauna variada. Hay aves de aspecto exótico como flamencos, aves playeras, y aves migratorias que van de isla en isla buscando un área de reposo nocturno y otro de alimentación propicia. Dentro de lo característico de la isla están algunas especies normalmente salvajes, que al no tener depredadores se acercan al visitante sin temor.

Todas las fotografías fueron tomadas por el autor los días 22, 23 y 24 de febrero de 2020.


Isla
Isla Salamanquilla



Siriri común: *Tyrannus melancholicus*, **Tropical Kingbird.**

Fotografía tomada el 22 de Febrero de 2020

Ave ubicua en todo el territorio nacional. De las aves vistas en la Isla, no podemos decir si son residentes o migratorias.

El Sirirí es un ave territorial que cuida su territorio, sobre todo al estar cuidando los huevos o las crías y pueden atacar a aves de mayor tamaño.

Su nombre hace honor a esta característica: Tyrannus, tirano, déspota y Melancholicus de mal carácter.



Maria mulata: Quiscalus mexicanus.
Una imagen de uno de sus hábitos. Robar alimentos en los restaurantes.
Fotografía 2 de Abril 2015

Guacamaya azul: *Ara ararauna,* Blue and Yellow Macaw

Se distribuye desde Panamá hasta Bolivia y Brasil. Están entre los mayores representantes de la familia psittacidae, bastante coloridas con colores que se inician en la frente de color oliváceo, degradándose progresivamente hasta azul. Su plumaje es bastante colorido con plumas amarillas, verdes, azules con diferentes tonos de los mismos colores. La cara desprovista de pluma es de piel blanca cruzada por lineas negras. Pico color negro característico de esta familia.





Guacamaya bandera: *Ara macao.*

Esta ave tiene una distribución más amplia que la anterior, desde México hasta Bolivia. En algunas regiones de Mexico su supervivencia está amenazada, pero dada su gran distribución, es clasificada por la UCIN, como especie de preocupación menor. Es un ave protegida, como especie amenazada, muchos países tienen leyes propias que protegen esta especie.

Fotografias tomadas 20 de Febrero 2020

Perico cara sucia: *Eupsitula pertinax,* Brown-Throated Parakeet.

Ave muy vocal y escandalosa, social, que se desplaza en grupos, pero formando parejas.
El espécimen observado no estaba acompañado por su pareja ni formaba parte de un grupo.

Fotografía: 22 de Febrero 2020.



Paloma corona blanca: *Patagioenas leucocephala,* White Crowned Pigeon.

Su comportamiento es algo nómada. Se desplaza por las Islas del caribe según los cambios en el suministro de alimentos. Suele volar a través de grandes distancias colonizando islas a lo largo de casi todo el Caribe.

Fotografía: 22 de Febrero2020





Gallina de guinea: Numida meleagris.

Ave endémica del Africa, que se ha distribuido por todo el mundo. Tienen un patrón de plumas muy peculiar, gris con punteado blanco. Es un ave controlador de las poblaciones de insectos. Además son aves guardianas, pues están alerta en forma permanente y avisan con sus gritos de la presencia de cualquier estímulo amenazante.

Fotografía: 4 de Abril 2015

Guacharaca caribeña: *Ortalis guarrula,* Chestnut winged Chalchalaca.

Es un ave endémica de Colombia, siendo la única guacharaca en el país con cabeza castaña y vientre blanco. Su región maxilar inferior es de piel desnuda y roja, sus patas y piel facial son color pizarra. La parte superior del pecho es color café oliva y la parte inferior es blanca. Sus graznidos se escuchan a distancia.
Fotografia 22 de Febrero 2020





Azulejo o Tángara azul: *Thraupis episcopus*,
Fotografía: 22 de Febrero 2020.



Flamenco: *Phoenicopterus ruber.* American flamingo

Ave que puede vivir hasta 40 años. Habita en aguas saladas lagos poco profundos, donde se le facilita estar de pie y donde hay gran cantidad de fango y que en los alrededores no haya ni vegetación ni animales.
Fotografía : 22 de Febrero 2020.







Aguila Pescadora*: Pandion haliaetus*.

Es un ave rapaz distribuida en todo el mundo excepto en la Antártida. Es color marrón en la parte dorsal y blanco en su parte ventral, antifaz marrón al igual que un pequeño copete. Pico y garras adaptadas para desgarrar.

Fotografía: 22 de Febrero 2020.



Pelicano occidental: *Pelecanus occidentalis*


Fotografía:22 de febrero2020





Garza tricolor: *Egretta tricolor*, Tricolored Heron.

Como la mayoría de las garzas vive en ambientes acuáticos. En zonas costeras, en marismas y zonas intermareales. Distribución amplia; desde el suroriente de Estados Unidos hasta Brazil.

Fotografía:23 de Febrero 2020



Fragata o Tijereta: Fregata magnificens, Magnificent Fragtebird.

Ave grande con alas quebradas y cola larga con hendidura profunda que le define su nombre vernáculo de tijereta.
El espécimen observado no tiene bolsa gula roja, com el macho, así que puede corresponder a una hembra o a un ave juvenil.
Fotografía tomada el 22 de febrero 2020.



Garcita verde: Butorides virescens.

Puede confundirse con la garcita Rayda (*Butorides estriata*). Se diferencia porque presenta el cuello, los lados de la cabeza y el pecho color marrón.
Fotografía: 25 de Febrero 2020



Garcita verde: *Butorides virecens*, Green Heron.
El color castaño del cuello la distingue de la *Butorides striata*,

Garcita verde vs. Garcita rayada.

Garcita verde: Butorides virescens, Green Heron.

Garza pequeña y regordeta de patas cortas negras sucias, que en los machos se tornan naranja brillante cuando presentan el plumaje reproductivo. La parte de atrás y los lados del cuello de los adultos son de color castaño, lo que la diferencia de la *Butorides striata;* su parte dorsal es verde mezclado con azul grisáceo y el centro de la garganta y el cuello son blancos. Presentan una corona de pluma negro verdosa.

Garcita rayada: Butorides striata, Striated Heron.

También es una ave pequeña y regordeta, de patas amarillas o naranja con una corona y cresta de color negro la cabeza el cuello y el pecho son grises, Tiene una franja blanca en la garganta que se ensancha en el pecho. Los inmaduros son de color café verdoso por encima con blanco rayado de café por debajo. Con este plumaje se confunden con la *Butorides vierescens.*



Garcita rayada: *Butorides striata*
Fotografía tomada el 3 de Abril 2015



Guaco Manglero

Nyctanassa violacea.

Espécien juvenil de Guaco Manglero muy parecido al Nycticorax nycticorax, pero con pico más grueso, de color café grisáceo y oscuro con manchas y rayado fino. Los adultos son de color gris pizarra . Las plumas de las rémiges primarias y secundarias son negruzcas. Frente y coronilla de color blanco y una franja blanca y grueso en el ojo. Ave de hábitos nocturnos y diurnos, es menos nocturna que el Nycticorax nycticorax. Pagina siguiente, espécimen adu*lto.*
Fotografia: 22 02 2020




Guaco manglero adulto: Nyctanassa violacea.
Fotografía 24 de Febrero 2020



Garza azul juvenil: *Egretta caerulea,* juvenil. Morfo blanco.

Conserva las patas color verdoso y pico azuloso en la parte proximal, mas oscuro en la mitad distal Iris amarillo.

Fotografia 22 de Febrtereo 2020



Garza azul juvenil y adulta: *Egretta caerulea*
Los especímenes juveniles son blancos con puntas obscuras en las plumas (página anterior). Los adultos azul pizarra con la cabeza y cuello de color violáceo . Iris color amarillo.



Garza real: A*rdea alba,* Great Egret.

Se le encuentra en humedales de agua dulce, aguas costeras y manglares como es el ambiente visible.

Fotografía : 22 de Febrero 2020



Garzón azul: *Ardea herodias,* Great Blue Heron.

Ave grande de color gris azulado, con una franja blanca que se extiende encima del ojo. Pico amarillo. Es un ave migratoria invernal que se observa en Colombia entre Octubre y Abril. Migra en grupos de hasta 100 o en solitario.

Fotografia 22 de Febrero 2020





Gaviotin real: Thalasseus maximus, Royal Tern.

Ave grande con llamativa cresta negra tupida; pico robusto entre naranja rojizo, patas negras.El plumaje no reproductivo consiste en un cuerpo blanco con la parte de atrás de la corona y nuca de color negro. La espalda y las alas son de color gris pálido. El plumaje reproductivo se diferencia porque toda la corona es negra. Este plumaje se puede apreciar en la imagen inferior de la próxima página.
Es un ave migratoria que se encuentra en Colombia, como residente de invierno o en tránsito. Se le puede apreciar tanto en la costa Caribe como Pacífica.
Es un ave muy ruidos y altamente social y es visible donde sea que se le encuentre, suele buscar alimentos en sitios lejanos a su lugar de cría, y por su tamaño accede a una variedad de presas de diferentes dimensiones.

Fotografía: 23 de Febrero2020





Gaviota Sandwich: *Thalasseus sandvicensis*.

Gaviota patanegra y pico negro delgado con punta amarilla , difícil de ver a la distancia o en ocasiones puede estar ausente. Coloración general blanca, con corona y nuca negras. La espalda y las alas son de color gris. Durante el plumaje reproductivo su capucha es completamente negra. Es una especie migratoria con movi - mientos de dispersión de norte a sur.



Playero aliblanco,Tringa semipalmeata: plumaje no reproductivo.
Fotografía 22 de Febrero 2020

Playero aliblanco: *Tringa semipalmeata*, Willet.

Ave playera, de pico grueso, mas grande que la cabeza. La parte inferior blanca y dorso marrón con pizcas negras. Patas largas grises. El plumaje no reproductivo se presenta en el adulto de la página anterior y un juvenil en la imagen de la derecha.

Fotografía 24 de Febrero2020





Zarapito común: *Numenius Phaeopus*, **Whimbrel .**

Fotografia: 23 de febrero 2020.




Zarapito trinador: *Numenius phaeopus*, Wimbrel

Ave playera grande, cuya característica más sobresaliente es su gran pico decurvado hacia abajo.

Fotografía 23 de Febrero 2020





Cigueñuela: *Himantopus mexicanus*, Black-necked Stilt.

Es un ave de apariencia conspicua e inconfundible. Con plumaje blanco en su parte ventral con chaquetilla ,cuello y parte coronal negro con mancha blanca retro ocular.

Fotografía: 23 de Febrero2020






Vuelve piedras: *Arenaria interpres*, Ruddy Turnstone.

Ave de hábitos migratorios con un amplio territorio de distribución que abarca de uno a diez millones de Km. cuadrados.
Su nombre popular representa el hábito de voltear las piedras para buscar su alimento a base invertebrados.
Para migrar y alimentarse forman grupos.
Los especímenes de las fotos, son adultos no reproductivos.

Fotografía: 22 de Febrero 2020



Andarríos solitario; Tringa solitaria. Sandpiper.

Ave solitaria durante su migración, migra desde Alaska y Canadá a pasar el invierno en Centro y Sur América.

Fotografía 22 de Febrero 2020



Andarrios Maculado: Actitis macularis. Spoptted Sandpiper.

Espécimen de vientre manchado durante el verano, se le encuentra en Colombia en condición de invernante.

Fotografía 22 de Febrero2020

EPÍLOGO.

Observar aves en cualquiera de nuestras islas del Caribe Colombiano, es una tarea agradable y reconfortante por lo que significa la parte recreativa turística, un aspecto aún no suficientemente explotado en nuestro país. Pero es una tarea inconclusa, que amerita visitar las Islas en diferentes épocas del año, para apreciar las diferentes olas migratorias de estos maravillosos animales, que son capaces de desplazarse por miles de kilómetros desde su lugar de origen y que nos lanza el reto moral, de conservar los ecosistemas naturales para proporcionarles, reposo y comida.
Esta pequeña muestra, muy seguramente seguirá creciendo y ameritará nuevas visitas a estos paridisíacos lugares.





AVES DE ISLA PALMA.

En esta recopilación hemos fotografiado 27 especies diferentes de aves, algunas residentes y casi todas migratorias, que viajan de isla en isla del archipiélago proporcionandose refugio y comida. Algunas como los flamencos han sido introducidas.